



Brachy: brachytherapie, BSO: Bilaterale salpingo-öoforectomie, chemo: chemotherapie, standaard carboplatin&paclitaxel en indien gecombineerd met EBRT: 2x cisplatin t.v. de EBRT en nadien 4x carboplatin/paclitaxel, EBRT: External beam radiotherapy, Ext field: extended field (para-aortaal veld), LVSI: uitgebreide lymfangioinvasie, M: status t.a.v. metastase(n), MI: myometrium invasie, N: lymfeklier status, Onb: onbekend, TLH: Totale laparoscopische hysterectomie.

CONSULTEER z.n. ENDORISK: RUBIN (akleinau.github.io)

~: Indien POLE, overweeg laagdrempeliger geen adjuvante therapie i.v.m. waarschijnlijk gunstige prognose

\*: Indien ER- & NMSP: laagdrempeliger chemo/PORTEC3 (behandeling als P53 mut overwegen ivm ongunstige prognose)

^: Indien MMRd: chemo in adjuvante setting lijkt minder effectief (weinig literatuur)

+ : Indien FIGO II, graad 1 EEC, <50%MI, geen P53: individualiseer

=: Indien FIGO IIIA, graad 1, zonder LVSI, <50% MI, geen P53: individualiseer